

# PERVINOX<sup>®</sup>

## ANESTÉSICO



**LIDOCAINA CLORHIDRATO  
CLORURO DE BENZALCONIO**

INDUSTRIA ARGENTINA  
Venta Libre

### **Antiséptico - Anestésico - Alivio del Dolor**

Previene infecciones de la piel, de heridas menores, raspaduras y quemaduras.

LIDOCAINA CLORHIDRATO 2.5 G  
CLORURO DE BENZALCONIO 0.13 G  
Solución Tópica en Spray

### **Fórmula**

Cada 100 ml de solución tópica en spray contiene: Lidocaína Clorhidrato 2.50 g, Cloruro de Benzalconio 0.13 g. Excipientes: edetato de sodio, octoxinol 9, fosfato dibásico de potasio, propilenglicol, esencia de eucalipto, agua destilada c.s.

**Este medicamento es Libre de Gluten.**

### **Indicaciones**

Para prevenir infecciones de la piel. Alivio del dolor y picazón por picaduras de insectos, heridas menores, raspaduras y quemaduras.

### **Posología**

Adultos y niños mayores de 2 años: Limpiar la zona afectada y aplicar una pequeña cantidad de PERVINOX<sup>®</sup> ANESTÉSICO, 1 a 3 veces por día. Puede cubrirse el área con un vendaje estéril. Antes de aplicar el vendaje, dejar secar la superficie.

### **Acción Farmacológica**

La Lidocaína tiene acción anestésica local, la absorción es rápida a través de las membranas mucosas y aumenta cuando se aplica sobre piel traumatizada o erosionada.

El Cloruro de Benzalconio es un agente tensioactivo poseedor de acciones detergentes, emulsificantes y antisépticas sobre un gran número de bacterias y hongos, facilitando la dispersión de otros principios activos y su contacto con la epidermis.

### **Acción Terapéutica**

Antiséptico-anestésico.

### **Acciones Colaterales y Secundarias**

Ocasionalmente rush cutáneo, urticaria o angioedema por reacción alérgica a la lidocaína.

### **Precauciones y Advertencias**

En caso de heridas profundas o punzantes, mordeduras y/o picaduras de animales o quemaduras

serias, consultar al médico.

Consultar inmediatamente al médico si las molestias persisten o se agravan.

### **Contraindicaciones**

Hipersensibilidad a los principios activos. No usar en los ojos ni aplicar en grandes superficies de la piel. No utilizar el medicamento más de una semana a menos que el médico indique lo contrario. No utilizar grandes cantidades del producto, particularmente sobre superficies escoriadas o ampolladas.

### **Importante:**

**En caso de sobredosis accidental, consulte inmediatamente al médico o póngase en contacto con:**

- **Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666 / 2247**
- **Hospital Dr. Alejandro Posadas: Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777**
- **Hospital General de Agudos J. A. Fernández: Tel.: (011) 4808-2655.**
- **Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: Tel.: (0221) 451-5555**

### **Presentaciones**

Pervinox® Anestésico (Spray): Envases con bomba por 40 y 60 ml.

**MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
NO EXPONER A TEMPERATURAS MAYORES DE 30° C.  
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO.**

Especialidad Medicinal Autorizada  
por el Ministerio de Salud. Certificado N° 46.625  
Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico.  
Laboratorio Elea Phoenix S.A. Avenida Gral. Lemos N° 2809,  
Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires.  
Para mayor información comunicarse  
con el Centro de Atención telefónica 0800-222-0818  
e-mail: [info@phoenix.com.ar](mailto:info@phoenix.com.ar) | [www.pervinox.com.ar](http://www.pervinox.com.ar)

**PHOENIX**