

**PERVINOX**  
**POVIDONA IODO**  
Jabón sólido

INDUSTRIA ARGENTINA  
Venta libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL MEDICAMENTO

**¿Qué contiene Pervinox?**

Cada 100 gramos de jabón sólido contiene:

Povidona Iodo 8 gramos.

Excipientes: lauril sulfato de sodio, alcohol cetílico, ácido esteárico, agua purificada.

**Acciones**

Antiséptico y desinfectante.

**¿Para qué se usa Pervinox jabón sólido?**

Se usa para desinfectar la piel en caso de pequeñas heridas, cortes superficiales, quemaduras leves o rozaduras.

**¿Qué personas no pueden usar Pervinox jabón sólido?**

NO USE este medicamento:

- si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes.
- al mismo tiempo que la aplicación de otros productos que contengan otros desinfectantes o antisépticos tópicos.
- si presenta trastornos de la glándula tiroidea.
- en menores de 5 años.

**¿Qué cuidados debo tener antes de usar Pervinox jabón sólido?**

No utilice este medicamento si: sufre quemaduras que afectan a más del 20% de la superficie corporal, tiene heridas grandes o abiertas, padece enfermedades del hígado o riñón, sufre problemas de la tiroides, está siendo tratado con medicamentos que contienen litio. Este medicamento es de uso externo, colocar exclusivamente sobre la piel, evitar el contacto con ojos, oídos y mucosas.

Este medicamento puede manchar la piel y la ropa. Para eliminar la mancha de la piel aplicar agua. Para quitar las manchas en la ropa, lavar la prenda con agua y jabón.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

**¿Qué cuidados debo tener mientras estoy usando Pervinox jabón sólido?**

Durante el período de utilización del producto pueden aparecer los siguientes efectos adversos: reacciones alérgicas, irritación local, picazón, ardor. Si esto sucede suspenda la medicación, lavar con agua y consultar al médico.

**¿Cómo se usa Pervinox jabón sólido?**

Uso externo solamente.

Limpieza general de heridas.

Usar para el lavado de la herida hasta lograr hacer espuma y luego enjuagar con abundante agua.

Realizar el lavado hasta 2 veces por día.

Si la lesión no mejora o empeora en 48 h, suspenda la medicación y consulte con el médico.  
No utilizar por más de 5 días.

**¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si usé más cantidad de la necesaria?**

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.  
Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666/2247.  
Hospital Dr. Alejandro Posadas. Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.  
Hospital General de Agudos J. A. Fernández. Tel.: (011) 4808-2655.  
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata. Tel.: (0221) 451-5555.

**¿Tiene usted alguna pregunta?**

ANMAT Responde 0800-333-1234.

**Forma de conservación**

Conservar a temperaturas no mayores de 30 °C.

**Presentaciones**

*Pervinox jabón sólido* se presenta en envases por 100 g.

**MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 34.648.

Director Técnico: Alfredo Boccardo - Farmacéutico.

Laboratorio Elea Phoenix S.A.

Calle (R202) Gral. Juan Gregorio Lemos N° 2809 (B1613AUE), Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires. Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica 0800-222-0818. e-mail:

[info@phoenix.com.ar](mailto:info@phoenix.com.ar)

*“El envase de venta de este producto lleva el nombre comercial impreso en sistema Braille para facilitar su identificación por los pacientes no videntes”.*

Fecha de última revisión: 19/10/ 2015